

दवा की खुराक का चार्ट

इसके लिए 2 एन्टीबायोटिक दवाएँ दी जाती हैं : जेन्टामाइसिन और कोट्रिमॉक्सेजोल

1. जेन्टामाइसिन की सुई दिन में एक बार

शिशु का वज़न 8 माह 14 दिन से पहले	समय से पूर्व जन्मा: जन्म के बाद 1 महीना पूरा होने पर	समय पूरा होने पर जन्मा या
1500 ग्रा. से कम	5 मि.ग्रा.	8 मि.ग्रा.
1500<2000 ग्रा. से कम	5 मि.ग्रा.	10 मि.ग्रा.
2000<2500 ग्रा. से कम	7 मि.ग्रा.	12 मि.ग्रा.
2500<3000 ग्रा. से कम	9 मि.ग्रा.	15 मि.ग्रा.
3000 ग्रा. या अधिक		18 मि.ग्रा.
	10 दिन तक दिन में एक बार	7 दिन तक दिन में एक बार

2. कोट्रिमॉक्सेजॉल सिरप (पीने की दवा) दिन में 2 बार

समय पूरा होने पर जन्मा शिशु : एक चौथाई चम्मच दिन में 2 बार × 7 दिन

समय से पूर्व जन्मा शिशु : एक चौथाई चम्मच दिन में 2 बार × 10 दिन