

अस्पताल कब भेजें?		
	सामान्य स्थिति (जितना जल्दी संभव हो)	आपातकालीन स्थिति (तुरंत)
गर्भावस्था	गंभीर एनीमिया बुखार पेशाब में जलन/ दर्द योनि से सफेद रंग का स्त्राव त्वचा पर खुजली/ दाद खाज/फोड़ा फुँसी / मवाद वाला फोड़ा इससे पूर्व गर्भावस्थाओं में बुरा अनुभव एक से अधिक गर्भ गर्भ की असामान्य स्थिति रतौंधी गर्भावस्था के दौरान देखभाल: आइरन फोलिक एसिड गोलियाँ तथा टिटनस की सुई उच्च रक्तचाप अथवा उसकी शंका	योनि से रक्तस्त्राव/ धब्बे गर्भ में शिशु का हिलना डुलना कम/ बंद सिरदर्द तथा धुँधला दिखाई देना दौरे चेहरे तथा हथेलियों में सूजन
प्रसव		लंबी प्रसवपीड़ा— हल्का दर्द उठने के 24 घंटों तक प्रसव न हुआ हो शिशु की असामान्य स्थिति — सिर के अलावा अन्य कोई भाग पहले निकले माँ को अत्यधिक रक्तस्त्राव हो रहा हो अवलनाल बाहर न निकले — 30 मि. के भीतर अवलनाल बाहर न आये माँ बेहोश हो या दौरे पड़ रहे हों, बच्चेदानी की झिल्ली फट गयी हो (24 घंटे से अधिक) योनि अथवा बच्चेदानी का कटना फटना
शिशु जन्म के बाद 1 से 28 वें दिन	नवजात शिशु को टीके माँ के स्तन सूजे हुए, लाल तथा स्तनो में दर्द बुखार	माँ योनि से बदबूदार द्रव निकल रहा हो तथा 100⁰फै. (37.8⁰सें) से अधिक बुखार हो शिशु जन्म के बाद अत्यधिक रक्तस्त्राव हो रहा हो— 24 घंटों में 5 से अधिक पैड बदले हों दौरे बुखार, बहुत बीमार उलटा सीधा बोलना या बर्ताव शिशु शिशु को स्तनपान करने में समस्या है जो आशा के परामर्श तथा घरेलू उपचार से ठीक नहीं हुई हो।

[illegible]